



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 18 du 30 juin 1998

Maïs Pyrale

Le vol de pyrale a débuté le dimanche 28 juin. Les conditions météorologiques chaudes du mois de mai et juin ont été favorables à son développement. De ce fait, le pic de vol devrait avoir lieu dans les prochains jours pour les postes de Coyviller, Lucey (54), Ancerville (55), Château-Salins, Albestroff, Laquenexy (57). Le traitement est donc à prévoir dans ces secteurs à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine.

Les conditions météorologiques devenant plus fraîches, le traitement pourra attendre la fin de la semaine prochaine dans les secteurs de Arrancy, Doncourt, Laronxe (54), Méligny, Montzéville (55), Kirschles-L. (57), Attignéville (88).

Rappel : Les secteurs les plus exposés aux attaques de pyrale restent le nord-est lunévillois jusqu'à Sarrebourg (voir postes de Laronxe, Château-Salins, Albestroff), le sud-ouest vosgien (Attignéville) et meusien (Ancerville, Méligny).

Les traitements à base de trichogrammes doivent avoir lieu immédiatement.

Blé Destruction des vivaces

La plupart des blés sont au stade pâteux.

Si vous avez des vivaces (liserons, chardons, chiendents,...) à détruire dans les parcelles, réaliser rapidement un désherbage avec un produit total.

Traiter par températures inférieures à 20-25°C lorsque l'humidité du grain est < à 25 % avec un produit à base de glyphosate ou de diquat.

Ne pas traiter les céréales destinées à la semence.

Maïs :

Traitement pyrale à prévoir dans les zones à risque.

